

**Euphon syrup contains: alcohol, sucrose, cochineal red A (E124), methyl para-hydroxybenzoate (E218) and propyl para-hydroxybenzoate (E216).**

### 3. HOW TO TAKE EUPHON SYRUP

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

#### Posology

USE RESTRICTED TO ADULTS AND CHILDREN OVER THE AGE OF 12 (and weighing more than 40 kg).

For oral use

If you do not observe any effect, do not increase the dose beyond what is recommended, and do not take in combination with another cough suppressant, but consult your doctor.

The recommended dosage is:

- Adults and adolescents over the age of 15 years (and weighing more than 50 kg): 1 or 2 tablespoons (15 ml) or 1 or 2 measuring cups of 15 ml per dose, to be repeated after 6 hours if necessary, without exceeding 4 doses per day.

In elderly patients, doses are to be reduced by half. Ask your doctor for advice.

- Children aged 12 to 15 years (and weighing approximately 40-50 kg): Use the measuring cup provided in the packet: 1 measured dose (measuring cup) of 10 ml, to be repeated after 6 hours if necessary, without exceeding 4 doses per day.

#### Special case

In cases of hepatic failure (severe liver disease): the doses of codeine are to be reduced by half at the start of treatment. Check with your doctor before taking this medicine.

In elderly patients, doses are to be reduced by half. Ask your doctor for advice.

#### Frequency of administration

The interval between doses should be a minimum of 6 hours.

This medicine should only be taken at the times when the cough occurs. For example, if the cough only occurs in the evening, a single dose may be sufficient.

#### Duration of treatment

Treatment should be of short duration (a few days) and limited to the times when coughing occurs.

This medicine has been prescribed for you in a specific situation:

- It cannot be used in any other case
- Do not pass it on to anyone else

#### If you take more Euphon syrup than you should

Ask your doctor for advice.

#### If you forget to take Euphon syrup

Resume treatment according to the prescription.

#### If you stop taking Euphon syrup

None, apart from the reappearance of the symptoms that motivated its prescription.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

### 4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

- constipation,
- drowsiness,
- dizziness,
- nausea, vomiting,
- difficulty breathing,
- allergic skin reactions.

#### Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system: French Agency for the Safety of Health Products (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [ANSM]) and network of Regional Pharmacovigilance Centres - Website: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

### 5. HOW TO STORE Euphon syrup

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack after EXP. The expiry date refers to the last day of that month. The bottle must be used within 30 days of opening.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

### 6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

#### What Euphon syrup contains

The active substances are:

Codeine ..... 0.100 g  
Dry aqueous extract of Erysimum officinale in maltodextrin (quantity of maltodextrin included in this amount of extract: 0.090 to 0.120 g).....0.300 g  
Per 100 ml of syrup

The other ingredients are:

citric acid monohydrate, cochineal red A (E124), natural raspberry flavour (alcoholate, alcoholature and concentrated raspberry extracts), methyl para-hydroxybenzoate (E218), propyl para-hydroxybenzoate (E216), alcohol, sucrose solution, purified water.  
Alcohol content: 2.7 vol%

1 tablespoon or measuring cup of 15 ml contains:

15 mg codeine  
10.28 g sucrose  
320 mg absolute alcohol

1 measuring cup of 10 ml contains:

10 mg codeine  
6.85 g sucrose  
213 mg absolute alcohol

1 measuring cup of 5 ml contains:

5 mg codeine  
3.43 g sucrose  
107 mg absolute alcohol

#### What Euphon syrup looks like and contents of the pack

This medicine is marketed in the form of a syrup.

Bottle of 150 ml or 300 ml with measuring cup.

#### Marketing authorisation Holder/ Distributor/ Manufacturer:

**LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER**  
6 AVENUE DE L'EUROPE  
78400 CHATOU

#### This leaflet was last revised on :

October 2017



#### Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que EUPHON, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUPHON, sirop ?
- Comment prendre EUPHON, sirop ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver EUPHON, sirop ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE EUPHON, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Antitussif - code ATC : R05D

Ce médicament contient un antitussif (la codéine).

Ce médicament est préconisé pour calmer les toux sèches, les toux d'irritation chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHON, sirop ?

##### Ne prenez jamais Euphon, sirop :

- si vous êtes allergique aux substances(s) active(s) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 4.
- insuffisance respiratoire
- toux de l'asthmatique
- enfants âgés de moins de 12 ans
- si vous savez que votre organisme métabolise très rapidement la codéine en morphine
- si vous allaitez

En raison de la présence de codéine, EUPHON, sirop n'est pas recommandé chez les adolescents de plus de 12 ans dont la fonction respiratoire est altérée.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en association avec l'alcool.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Avvertissements et précautions.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Euphon sirop.

#### Attention !

Le titre alcoolique de ce sirop est de 2,7% (2,7% % (V/V)) soit 320 mg d'alcool (éthanol) pour une cuillère à soupe de sirop (15 ml) ou un godet à 15 ml, 213 mg pour un godet à 10 ml.

L'utilisation de ce médicament est dangereuse pour les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

En raison de la présence de rouge cochenille A, ce médicament peut provoquer des réactions allergiques, voire de l'asthme, en particulier chez les personnes allergiques à l'aspirine.

Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

Si les symptômes persistent ou si la toux devient grasse ou s'accompagne d'encombrement bronchique, d'expectoration (rejet en crachant des sécrétions bronchiques), de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.

En cas de maladie chronique (au long court) des bronches et des poumons s'accompagnant d'expectoration, un avis médical est indispensable.

La codéine est transformée en morphine par une enzyme dans le foie. La morphine est la substance qui produit les effets de la codéine. Certaines personnes possèdent des variantes de cette enzyme, ce qui peut avoir un impact différent selon les personnes. Ainsi chez certaines d'entre elles, la codéine n'est que très peu ou pas du tout transformée en morphine par l'organisme. La codéine administrée n'aura alors pas d'effet sur leur toux. D'autres personnes sont plus susceptibles de ressentir des effets indésirables graves, car une très grande quantité de morphine est produite. Si vous remarquez l'un des quelque effets indésirables suivants, vous devez arrêter de prendre ce médicament et consulter immédiatement un médecin :

respiration lente ou superficielle, confusion mentale, somnolence, pupilles contractées, nausées ou vomissements, conspigation, perte d'appétit.

En cas d'insuffisance hépatique (maladie grave du foie) ou de maladie chronique du foie, DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN (Voir rubrique 3 ci-dessous).

La prise de boissons alcoolisées est déconseillée durant ce traitement.

Ne pas associer à un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique).

Chez le diabétique : tenir compte de la teneur en sucre (saccharose) : 10,28g par cuillère à soupe.

#### Autres médicaments et EUPHON, sirop

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN

Ce médicament contient un antitussif, la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées (voir Posologie et Mode d'administration).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Grossesse

Il est possible de prendre ce médicament pendant votre grossesse, à condition que cela soit pendant un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées. Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner un effet néfaste chez le nouveau-né.

Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament et de ne jamais dépasser la dose préconisée.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Allaitement

Ne prenez pas EUPHON, sirop tant que vous allaitez. La codéine et la morphine passent dans le lait maternel. De trop fortes doses de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules (automobiles, deux roues) et les utilisateurs de machines sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament.

Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises; il peut être préférable de commencer ce traitement le soir.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

#### Euphon, sirop contient : alcool, saccharose, rouge cochenille A (E124), parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et parahydroxybenzoate de méthyle de propyle (E216)

### 3. COMMENT PRENDRE EUPHON, SIROP ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### Posologie

RÉSERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 12 ANS (et pesant plus de 40 kg).

Voie orale

En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consulter votre médecin.

La posologie recommandée est :

- Adulte et adolescent de plus de 15 ans (et pesant plus de 50 kg): 1 à 2 cuillères à soupe (15 ml) ou 1 à 2 mesures graduées de 15 ml du godet-doseur de sirop par prise à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin sans dépasser 4 prises par jour.

Chez les sujets âgés, les doses seront diminuées de moitié. Demandez l'avis de votre médecin.

- Enfant de 12 à 15 ans (et pesant environ 40 à 50 kg de poids corporel):

Utiliser le godet doseur gradué fourni dans la boîte : 1 mesure graduée (godet) à 10 ml à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.

#### Cas particulier

En cas d'insuffisance hépatique (maladie grave du foie) : les doses de codéine, en début de traitement seront diminuées de moitié. Consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Chez les sujets âgés, les doses seront diminuées de moitié. Demandez l'avis de votre médecin.

#### Fréquence d'administration

Les prises doivent être espacées de 6 heures au minimum.

Ce médicament n'est à administrer qu'aux horaires où survient la toux. Par exemple pour une toux ne survenant que le soir, une prise unique peut suffire.

#### Durée du traitement

Le traitement doit être court (quelques jours) et limité aux moments où survient la toux.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit dans une situation précise :

- Il ne peut pas être adapté à un autre cas
- Ne le donnez pas à une autre personne

#### Si vous avez pris plus de Euphon sirop que vous n'auriez dû

Demandez l'avis de votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre Euphon sirop

Reprenez le traitement conformément à la prescription.

#### Si vous arrêtez de prendre Euphon sirop

Aucun en dehors de la réapparition des troubles ayant motivé la prescription.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- constipation,
- somnolence,
- vertiges,
- nausées, vomissements,

- gêne respiratoire,
- réactions cutanées allergiques.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER Euphon sirop ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Le flacon doit être utilisé dans les 30 jours après ouverture.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient Euphon sirop

Les substances actives est sont :

Codéine ..... 0,100 g  
Extrait sec aqueux sur maltodextrine d'érysimum officinale (maltodextrine incluse dans la masse d'extrait: 0,090 à 0,120 g) ..... 0,300 g  
Pour 100 ml de sirop

Les autres composants excipients sont :

acide citrique monohydraté, rouge cochenille A (E124), arôme naturel framboise (alcoolate, alcoolature et extraits concentrés de framboise), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), alcool, solution de saccharose, eau purifiée.  
Titre alcoolique: 2,7 % v/v

1 cuillère à soupe ou le godet gradué à 15 ml contient:

15 mg de codéine  
10,28 g de saccharose  
320 mg d'alcool absolu

1 godet gradué à 10 ml contient:

10 mg de codéine  
6,85 g de saccharose  
213 mg d'alcool absolu

1 godet gradué à 5 ml contient:

5 mg de codéine  
3,43 g de saccharose  
107 mg d'alcool absolu

#### Qu'est-ce que Euphon sirop et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme d'un sirop. Flacon de 150 ml ou de 300 ml avec godet.

#### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché/ Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché/ Fabricant :

**LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER**  
6 AVENUE DE L'EUROPE  
78400 CHATOU

#### La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

Octobre 2017

#### Information médicale : +33 (0)1 34 80 72 60



#### Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

#### What is in this leaflet?

- What EUPHON syrup is and what it is used for
- What you need to know before you take EUPHON syrup
- How to take EUPHON syrup
- Possible side effects
- How to store EUPHON syrup
- Contents of the pack and other information.

#### 1. WHAT EUPHON SYRUP IS AND WHAT IT IS USED FOR

Pharmacotherapeutic group: Cough suppressant - ATC code: R05D

This medicine contains a cough suppressant (codeine).

This medicine is recommended for soothing dry coughs and irritating coughs in adults and children over the age of 12.

You must talk to your doctor if you do not feel better or if you feel worse.

#### 2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE EUPHON SYRUP

##### Do not take EUPHON syrup:

- if you are allergic to the active substance(s) or any of the other ingredients of this medicine listed in section 4.
- respiratory failure
- asthmatic cough
- children under the age of 12
- if you know that your body metabolises codeine into morphine very rapidly
- if you are breast-feeding

Due to the presence of codeine, EUPHON syrup is not recommended for adolescents over the age of 12 with impaired respiratory function.

This medicine SHOULD NOT GENERALLY BE USED in combination with alcohol.

CHECK WITH YOUR DOCTOR OR PHARMACIST IF YOU ARE NOT SURE.

#### Warnings and precautions:

Speak to your doctor or pharmacist before taking Euphon syrup.

#### Warning!

The alcohol content of this syrup is 2.7 vol%, equivalent to 320 mg alcohol (ethanol) per tablespoon of syrup (15 ml) or 15 ml measuring cup, or 213 mg per 10 ml measuring cup.

This medicine is dangerous for patients with alcoholism and must be taken into account in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups such as those with hepatic impairment or epilepsy. Ask your doctor for advice before taking this medicine.

Due to the presence of cochineal red A, this medicine may cause allergic reactions or asthma, especially in people allergic to aspirin.

Do not use this medicine to treat a productive cough. In such cases, coughing is a natural means of defence which is necessary for the removal of bronchial secretions.

If symptoms persist or if the cough becomes productive or is accompanied by bronchial congestion, expectoration (coughing up of bronchial secretions) or fever, please ask your doctor for advice.

In the event of chronic (long-term) disease of the bronchi and lungs accompanied by expectoration, medical advice is essential.

Codeine is converted to morphine by an enzyme in the liver. Morphine is the substance that produces the effects of codeine. Some people have variations of this enzyme, which can have a different impact from person to person. In some people, the body converts codeine to morphine to a very low extent or not at all.

In such cases, the codeine administered will not have any effect on their cough. Other people are more likely to experience serious adverse effects, because a very large amount of morphine is produced. If you notice any of the following side effects, you must stop taking this medicine and consult a doctor immediately: slow or shallow breathing, mental confusion, drowsiness, small pupils, nausea or vomiting, constipation, loss of appetite.

In the case of liver failure (severe liver disease) or chronic liver disease, PLEASE ASK THE OPINION OF YOUR DOCTOR (see section 3 below).

The consumption of alcoholic beverages is not recommended during this treatment.

Do not take this medicine at the same time as a medicine to thin bronchial secretions (expectorant, mucolytic).

For diabetic patients: please note the sugar content (sucrose): 10.28 g per tablespoon.

#### Other medicines and EUPHON syrup

IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL MEDICINES, YOU SHOULD ALWAYS TELL YOUR DOCTOR OR PHARMACIST ABOUT ALL OTHER TREATMENTS THAT YOU ARE TAKING.

This medicine contains a cough suppressant called codeine. Other medicines may