SUPPOSITOIRES à la GLYCÉRINE

MAYOLY SPINDLER
GLYCÉROL

> ADULTES
> ENFANTS
> NOURRISSONS

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ?
3. Comment utiliser SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ?
6. Informations supplémentaires.
7. A propos de la constipation.

1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament appartient à la famille des laxatifs par voie rectale. Il déclenche le réflexe de défécation.
Il est utilisé :
- dans le traitement des symptômes de certaines formes de constipation,
- comme préparation à certains examens du rectum (rectoscopie).

La forme "suppositoire adulte" est réservée à l'**ADULTE**.
La forme "suppositoire enfant" est réservée à l'**ENFANT**.
La forme "suppositoire nourrisson" est réservée au **NOURRISSON**.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ?

N'utilisez jamais SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER
Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le glycérol) ou à l'un des autres composants contenus dans SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER .
Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.

Faites attention avec SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ADULTES
Avant d'utiliser ce médicament, vous devez prévenir votre médecin si :
- vous avez une maladie des intestins appelée rectocolite hémorragique,
- vous souffrez au niveau de l'anus (fissure anale, crise hémorroïdaire).

Dans ces situations, il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse
Demandez également conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Faites attention avec SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER NOURRISSONS / ENFANTS
Vous ne devez pas donner ce médicament à votre nourrisson / enfant sans avoir consulté au préalable votre médecin, car l'administration régulière chez un enfant d'un laxatif par voie rectale peut perturber le fonctionnement normal de son réflexe de défécation.
Avant de donner ce médicament à votre nourisson / enfant, vous devez prévenir votre médecin si :
- votre nourrisson / enfant a une maladie des intestins appelée maladie colique,
- votre nourrisson / enfant souffre d'une maladie au niveau de l'anus appelée maladie rectale.

Dans ces situations, il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si votre nourrisson / enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
Bien que ce médicament soit destiné aux nourrissons / enfants, les recommandations suivantes sont données à titre d'information :
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ?

Posologie

ADULTES
Respectez toujours la posologie indiquée dans cette notice. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
La dose habituelle est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle.
Ceci peut être renouvelé une fois dans la demi-heure ou l'heure qui suit si vous êtes toujours constipé(e).

ENFANTS
Respectez toujours la posologie indiquée dans cette notice. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Enfants de 2 à 6 ans : la dose habituelle est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle.
- Enfants de plus de 6 ans : la dose habituelle est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle.

Cette dose peut être renouvelée une fois dans la demi-heure ou l'heure qui suit si votre enfant est toujours constipé.

NOURRISSONS
Consultez votre médecin.
Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

ADULTES / ENFANTS / NOURRISSONS
Mode et voie d'administration
Ce médicament est utilisé par voie rectale.
Le suppositoire doit être introduit au niveau de l'anus.
Si besoin, vous pouvez tremper le suppositoire dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction. Il agit en 5 à 30 minutes.

Durée du traitement
Vous ne devez pas utiliser ce médicament de manière prolongée sans avoir consulté votre médecin.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Des sensations de brûlures peuvent survenir au niveau de l'anus.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.
Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Que contient SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER ?
ADULTES
La substance active est :
le glycérol (2,1 g pour un suppositoire de 3,5 g).
Les autres composants sont :
la gélatine et l'eau purifiée.

ENFANTS
La substance active est :
le glycérol (1,29 g pour un suppositoire de 2,15 g).
Les autres composants sont :
la gélatine et l'eau purifiée.

NOURRISSONS
La substance active est :
le glycérol (0,69 g pour un suppositoire de 1,15 g).
Les autres composants sont :
la gélatine et l'eau purifiée.

Qu'est-ce que SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER et contenu de l'emballage extérieur ?
SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE MAYOLY SPINDLER se présente sous forme de suppositoires.
Chaque boîte contient 10 suppositoires.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est décembre 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France) : www.ansm.sante.fr

7. À PROPOS DE LA CONSTIPATION
ADULTES / ENFANTS / NOURRISSONS
Constipation occasionnelle :
Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :
Elle peut être liée à deux causes :
- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Cas particulier de l'ADULTE :
Le traitement comporte entre autres :
- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits....),
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Cas particulier du NOURRISSON et de l'ENFANT :
Chez le nourrisson et l'enfant, le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique et notamment :
- l'utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de lait infantiles,
- une alimentation riche en produits d'origine végétale,
- une adjonction de jus de fruits.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Titulaire
Laboratoires MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l'Europe - BP 51
78401 CHATOU CEDEX - France
Information médicale : +33 (0)1 34 80 72 60

Exploitant
Laboratoires MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l'Europe - BP 51
78401 CHATOU CEDEX - France

Fabricant
Laboratoires GALENIQUES VERNIN
20, rue Louis-Charles Vernin
77190 DAMMARIE-LES-LYS - France

MAYOLY SPINDLER

7081200