

## **1) DENOMINATION DU MEDICAMENT**

**EUROBIOL 25 000 U, gélule gastro-résistante**

## **2) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE**

Poudre de pancréas d'origine porcine\* ..... 274,050 – 329,875 mg  
Pour une gélule.

\* Quantité correspondant à une activité enzymatique de :

Activité lipolytique : ..... 25 000 U Ph. Eur.

Activité amylolytique : ..... 22 500 U Ph. Eur.

Activité protéolytique : ..... 1 250 U Ph. Eur.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

## **3) FORME PHARMACEUTIQUE**

Gélule gastro-résistante.

## **4) DONNEES CLINIQUES**

### **4.1. Indications thérapeutiques**

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée  $\geq 6$  g/24 h ;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

### **4.2. Posologie et mode d'administration**

#### Posologie

La posologie optimale doit être recherchée et modulée au cours du temps, en fonction du régime alimentaire et de l'état digestif du patient, c'est-à-dire du nombre de selles et de la stéatorrhée.

La posologie usuelle quotidienne est :

- nourrisson jusqu'à 18 mois : 2 gélules
- enfant : 4 gélules
- adulte : 6 gélules

#### Mode d'administration

EUROBIOL doit être administré en 2 ou 3 prises quotidiennes, au cours des repas.

Les gélules peuvent être ouvertes chez les enfants ne pouvant les avaler et chez les nourrissons. Il conviendra de ne pas croquer les microgranules et de les administrer dans un milieu non alcalin (jus d'orange par exemple) de manière à éviter un délitement prématuré. Il est également recommandé d'ouvrir les gélules en cas de gastrectomie.

Il est important de maintenir une bonne hydratation des patients, notamment en période de chaleur.

### **4.3. Contre-indications**

Sans objet.

#### **4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

##### **Mises en garde spéciales**

Des sténoses coliques ont été observées à l'étranger, chez des enfants atteints de mucoviscidose, lors de l'utilisation de fortes doses quotidiennes d'extraits pancréatiques, présentés sous forme gastro-résistante. Les doses étaient dans tous les cas supérieures d'au moins 4 fois aux doses habituellement préconisées en France.

Il convient de s'assurer de la stéatorrhée  $\geq 6$  g/24 h avant de prescrire EUROBIOL 25 000 U au cours des pancréatites chroniques documentées.

Le risque de maladie infectieuse dû à la transmission d'agents infectieux ne peut pas être totalement exclu lors de l'administration de médicaments contenant des extraits de poudre de pancréas d'origine animale.

Le parvovirus porcin peut être présent dans ces extraits. Toutefois, ce virus n'est pas reconnu comme étant transmissible à l'homme et pathogène pour celui-ci.

La détection du parvovirus porcin dans les extraits de poudre de pancréas peut indiquer la présence possible d'autres virus d'origine animale, mais aucun cas de transmission de maladie infectieuse n'a été rapporté avec ces médicaments, alors qu'ils sont utilisés depuis longtemps.

Le risque viral potentiel apparaît très inférieur au bénéfice thérapeutique de ce médicament dans l'indication d'insuffisance pancréatique exocrine documentée, notamment la mucoviscidose.

##### **Précautions d'emploi**

Cette spécialité est fortement dosée en lipase ; il conviendra donc, chez certaines personnes d'augmenter très progressivement la posologie lors de la mise en route du traitement en raison du risque de constipation sévère en cas de surdosage.

La posologie recommandée peut parfois être augmentée sur prescription médicale en fonction de l'importance de l'insuffisance pancréatique exocrine. Dans tous les cas, il ne faut jamais dépasser la dose de 10 000 unités de lipase/kg/jour chez l'enfant (soit 0,4 gélule/kg/jour ; exemple : pour un enfant de 10 kg, ne pas dépasser 4 gélules par jour), et de 250 000 unités de lipase/jour chez l'adulte (soit 10 gélules par jour).

Des troubles digestifs peuvent survenir chez les sujets présentant une hypersensibilité aux extraits pancréatiques.

Il convient d'être particulièrement vigilant chez les sujets mucoviscidosiques ayant eu un iléus méconial, une résection intestinale, des manifestations d'équivalent tardif d'iléus.

#### **4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions**

Sans objet.

#### **4.6. Fertilité, grossesse et allaitement**

##### **Grossesse**

Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal.

En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un éventuel effet malformatif ou fœtotoxique d'EUROBIOL 25 000 U, gélule gastro-résistante lorsqu'il est administré pendant la grossesse.

L'utilisation d'EUROBIOL 25 000 U ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

##### **Allaitement**

Il n'existe pas de données de passage des extraits pancréatiques dans le lait maternel. Cependant, en raison de l'absence d'effets secondaires attendus chez le nouveau-né, ce médicament peut être prescrit au cours de l'allaitement.

#### **4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

Sans objet.

#### **4.8. Effets indésirables**

Ce médicament peut entraîner chez certaines personnes des troubles digestifs (constipation).

#### **Déclaration des effets indésirables suspectés**

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

#### **4.9. Surdosage**

Chez l'enfant, risque de constipation sévère.

### **5) PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES**

#### **5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

**Classe pharmacothérapeutique : PREPARATIONS ENZYMATIQUES, code ATC : A09AA02.**

La présentation d'EUROBIOL, sous la forme gélule gastro-résistante, permet de protéger les enzymes pancréatiques de l'acidité gastrique. L'activité enzymatique peut ainsi être libérée au niveau duodéno-jéjunal.

#### **5.2. Propriétés pharmacocinétiques**

Les micro-comprimés restent stables en milieu acide pour un pH inférieur à 5,5. Ils se délitent au niveau du duodéno-jéjunum.

#### **5.3. Données de sécurité précliniques**

Sans objet.

### **6) DONNEES PHARMACEUTIQUES**

#### **6.1. Liste des excipients**

Cellulose microcristalline, crospolyvidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, copolymère d'acide polyméthacrylique-acrylate d'éthyle (1:1), citrate de triéthyle, talc, siméticone, esters d'acide montanique et d'éthane diol (cire dure E).

Composition de l'enveloppe de la gélule :

Gélatine, dioxyde de titane, oxyde de fer rouge, oxyde de fer noir.

#### **6.2. Incompatibilités**

Sans objet.

#### **6.3. Durée de conservation**

Présentation en flacon de verre : 3 ans

Autres présentations : 2 ans.

Après ouverture, le produit doit être utilisé dans les 6 mois.

#### **6.4. Précautions particulières de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

#### **6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur**

40, 60, 80, 100 ou 120 gélules en flacon (polypropylène).

80 ou 100 gélules en sachet (papier/PE/Alu/PE).

30, 40, 60, 80, 90, 100 ou 120 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).  
20, 50 ou 100 gélules en flacon (verre de type III).

#### **6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation**

Pas d'exigences particulières.

### **7) TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Laboratoires MAYOLY SPINDLER  
6 Avenue de l'Europe  
78400 CHATOU – France  
Standard : Tél. : 01 34 80 55 55  
Information médicale : Tél. : 01 34 80 72 60

### **8) NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

34009 331 162 8 6 : 40 gélules en flacon (polypropylène).  
34009 331 163 4 7 : 60 gélules en flacon (polypropylène).  
34009 331 164 0 8 : 80 gélules en flacon (polypropylène).  
34009 331 165 7 6 : 100 gélules en flacon (polypropylène).  
34009 331 166 3 7 : 120 gélules en flacon (polypropylène).  
34009 559 138 8 7 : 80 gélules en sachet (papier/PE/Alu/PE).  
34009 559 139 4 8 : 100 gélules en sachet (papier/PE/Alu/PE).  
34009 343 501 7 7 : 30 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).  
34009 341 465 3 4 : 40 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).  
34009 341 467 6 3 : 60 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).  
34009 341 468 2 4 : 80 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).  
34009 342 500 7 1 : 90 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).  
**34009 559 889 3 9 : 100 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).**  
34009 559 890 1 1 : 120 gélules en plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/Alu).  
34009 347 269 1 0 : 20 gélules en flacon (verre de type III).  
34009 347 271 6 0 : 50 gélules en flacon (verre de type III).  
**34009 395 333 8 4 : 100 gélules en flacon (verre de type III).**

### **9) DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation : 22 juin 1988  
Date du dernier renouvellement : 22 juin 2008.

### **10) DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE**

25 avril 2018.

### **11) DOSIMETRIE**

Sans objet.

### **12) INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES**

Sans objet.

---

### **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE**

Liste I.

- Boîte de 100 gélules : Non remboursé Séc. Soc. Agréée aux collectivités.
- Flacon de 100 gélules : Remboursé Séc. Soc. à 65% - Agréé aux collectivités – PRIX : 26,83 €. C.T.J. : 0,56 € à 1,68 €.