

SUPPOSITOIRES

à la GLYCÉRINE

MAYOLY SPINDLER

GLYCÉROL

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Dans cette notice :
1. Qu'est-ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire ?
 3. Comment utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
AUTRES LAXATIFS
(A : Appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques
Ce médicament est utilisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament
La forme "suppositoire adulte" est réservée à l'**ADULTE**.
La forme "suppositoire enfant" est réservée à l'**ENFANT**.
La forme "suppositoire nourrisson" est réservée au **NOURRISSON**.

Contre-indication
N'utilisez jamais SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER ADULTES et ENFANTS, suppositoire dans les cas suivants :

- Allergie (hypersensibilité) au glycérol ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique « Informations supplémentaires ».

Ne donnez jamais SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER NOURRISSONS, suppositoire dans les cas suivants :

- Allergie (hypersensibilité) au glycérol ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique « Informations supplémentaires ».

Précautions d'emploi, mises en garde spéciales
Faites attention avec SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire :

- Si vous ou votre enfant avez une maladie des intestins appelée rectocolite hémorragique ;
- Si vous ou votre enfant souffrez au niveau de l'anus (fissure anale, crise hémorroïdaire). Dans ces situations, il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament.

- > ADULTES
- > ENFANTS
- > NOURRISSONS

Chez l'enfant la prescription de laxatifs par voie rectale doit être exceptionnelle : elle doit prendre en compte le risque d'entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous ou votre enfant prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse et allaitement
En l'absence de données cliniques chez la femme enceinte ou allaitante, il est préférable de ne pas prendre ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement
Voie rectale. Le suppositoire doit être introduit au niveau de l'anus.
Si besoin, le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

ADULTES
La dose habituelle est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle, à renouveler 1 fois dans la demi-heure ou l'heure qui suit si vous êtes toujours constipé(e).

NOURRISSONS
1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération avec interruption de 24 heures tous les 3 jours.

ENFANTS
Enfants de 2 à 6 ans : la dose habituelle est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle.
Enfants de plus de 6 ans : la dose habituelle est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle. Cette dose peut être renouvelée une fois dans la demi-heure ou l'heure qui suit si votre enfant est toujours constipé.

Le traitement de la constipation ne doit pas, en moyenne, dépasser 10 jours.
Vous ne devez pas utiliser ce médicament de manière prolongée sans avoir consulté votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage
Si vous avez donné à votre enfant plus de SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER NOURRISSONS/ENFANTS que vous n'auriez dû :
Votre nourrisson ou votre enfant peut avoir de la diarrhée. Dans ce cas, diminuez la dose ou arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de donner SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER NOURRISSONS/ENFANTS :
Ne donnez pas à votre nourrisson ou à votre enfant de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de lui donner.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Sensation de brûlures anales ;
- Exceptionnellement rectites congestives.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER, suppositoire ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditions de conservation
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER ADULTES, suppositoire ?
La substance active est :
Glycérol.....2,10 g
Pour un suppositoire de 3,50 g.

Que contient SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER NOURRISSONS, suppositoire ?
La substance active est :
Glycérol.....0,69 g
Pour un suppositoire de 1,15 g.

Que contient SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER ENFANTS, suppositoire ?
La substance active est :
Glycérol.....1,290 g
Pour un suppositoire de 2,15 g.

Les autres composants sont :
Gélatine, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu
Qu'est ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER ADULTES, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suppositoires en boîte de 10, 30 ou 100 suppositoires.

Qu'est ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE MAYOLY SPINDLER NOURRISSONS/ENFANTS, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de suppositoires en boîte de 10 ou 30 suppositoires

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
6 AVENUE DE L'EUROPE BP 51
78401 CHATOU CEDEX

Exploitant
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
6 AVENUE DE L'EUROPE BP 51
78401 CHATOU CEDEX

Fabricant
Laboratoires GALENIQUES VERNIN
20 RUE LOUIS-CHARLES VERNIN
77190 DAMMARIE-LES-LYS

Information médicale :
France : +33 (0)1 34 80 72 60

Date d'approbation de la notice
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Octobre 2022

Informations Internet
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

Autres
CONSEILS / EDUCATION THERAPEUTIQUE

Constipation occasionnelle :
Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpiquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :
Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement chez l'adulte comporte entre autres :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits),
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Cas particuliers de l'enfant et du nourrisson
Chez l'enfant et le nourrisson, le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique et notamment :

- l'utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de lait infantiles,
- une alimentation riche en produits d'origine végétale,
- une adjonction de jus de fruits.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.



7281720